



Aspectos demográficos, clinicoendoscópicas y anatomopatológicos de pacientes con cáncer de colon recurrente

MSc. Odalis Despaigne Guillot, DrC. Nelsa María Sagaró del Campo, MSc. Jesús Díaz Fondén, MSc Xiomara Hechavarría Masabeau, MSc Gabriel Lesme ReyteSola, Dra Gretchen Cabrejas Martínez

Hospital Provincial “Saturnino Lora”. Santiago de Cuba, Cuba

Objetivos

Caracterizar a pacientes con cáncer de colon recurrente según variables demográficas, clinicoendoscópicas y anatomopatológicas del tumor primario.

Métodos: se realizó un estudio observacional descriptivo de serie de casos, que incluyó a 63 pacientes que tuvieron recurrencia del cáncer de colon, con seguimiento en tres hospitales de la provincia de Santiago de Cuba, desde enero de 2017 hasta diciembre de 2023. Para describir aspectos demográficos, clinicoendoscópicos y anatomopatológicos del tumor primario, las categorías de cada variable fueron expresadas en frecuencias absolutas (no de casos) y en frecuencias relativas (porcentaje).

RESULTADOS

Tabla 1. Pacientes según características demográficas

Características demográficas	N	(%)
Edad (años)		
≥65	26	41,27
28-64	37	58,73
Sexo		
Masculino	33	52,38
Femenino	30	47,62

Tabla 2. Pacientes según características clinicoendoscópicas

Características demográficas	N	(%)
O/P p-o		
No	15	23,81
Si	48	76,19
Localización del tumor		
Derecha	31	49,21
Izquierda	32	50,79

Nota: O/P p-o, Obstrucción o perforación preoperatoria

Tabla 3. Pacientes según características anatomopatológicas del tumor primario (parte 1)

Características anatomopatológicas	N	(%)
Márgenes de resección tumoral		
Libres	60	95,24
Tomados	3	4,76
Clasificación histológica		
Bajo grado	53	84,13
Alto grado	10	15,87
Categoría pT		
Categoría pT1/pT2	5	7,94
Categoría pT3/pT4	58	92,06
Número de GLR		
suficiente	12	19,05
insuficiente	51	80,95

Nota: GLR, ganglios linfáticos resecados.

Tabla 3. Pacientes según características anatomopatológicas del tumor primario (parte 2)

Características anatomopatológicas	N	(%)
Razón ganglionar		
baja	19	30,16
alta	44	69,84
Categoría pN		
Categoría pN0/pN1	14	22,22
Categoría pN2	49	77,78
Estadio pTNM		
Estadio pTNM I/II	6	9,52
Estadio pTNM III	57	90,48
Invasión linfovascular		
No/linfática o vascular	19	30,16
Linfovascular	44	69,84

Conclusiones: la recurrencia de la enfermedad predominó en los pacientes no longevos, con tumores primarios, que invadían el peritoneo visceral u órgano adyacente y con invasión a las estructuras linfovasculares. La mayoría de las lesiones presentaron invasión ganglionar en 4 o más nódulos regionales, incluso, aun resecándose, generalmente, un número insuficiente de estos.